

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-4-69 214729

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

11, Rue de la Vigilance — 69 - LYON-3^e
Tél. 60-66-24 et 60-69-55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C.C.P. LYON 9431-17
Régisseur Avances et Recettes D.D.A.
51, Av. Maréchal-Foch - LYON-6^e

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 103 d'Avril 1969

11 Avril 1969

page 10

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - En raison de la reprise de la croissance, renouveler le traitement précédent au bout de 12 jours environ.

TAVELURE DU POMMIER - Le temps froid, puis sec, n'a pas été favorable à l'évolution de la maladie; aucune extension du premier traitement ne s'impose pour l'instant. En revanche, dans les régions concernées par le bulletin précédent, un nouveau traitement devra être appliqué vers le 15 avril.

HOPLOCANPE DU POIRIER - Sur les quelques plantations attaquées ces dernières années, notamment dans la moyenne vallée du Rhône, appliquer un traitement à la chute des pétales.

INFORMATIONS

CHARANCONS & CHENILLES DEFFUILLANTES - Surveiller leur apparition et traiter éventuellement dès les premiers dégâts.

XYLEBORE - Les conditions favorables à l'activité du ravageur et à l'application du traitement se sont présentées les 8 et 9 avril. Les traitements effectués après ces dates risquent d'être beaucoup moins efficaces.

ACARIENS - Les premières éclosions sont en cours; un traitement devra être envisagé entre le 15 et le 20 avril.

CULTURES DIVERSES

FRAISIER - Pourriture grise: Appliquer un premier traitement en début de floraison (Dichlofluanide à 1kg/ha, Phaltane, Captafol ou Captane à 2kg/ha ou Thirame à 3kg/200/ha. Renouveler à 50% de la floraison et à la fin de celle-ci.

- Ramularia: 4 traitements (Manèbe à 240gr/hl) peuvent être appliqués à 10 jours d'intervalle jusqu'au début de la coloration des fruits.

COLZA - Meligèthe: Nous rappelons que les traitements doivent cesser à l'ouverture des premières fleurs.

LAVANDE - Cécidomyie des fleurs: Le vol de l'insecte est terminé au-dessous de 700m où le traitement ne s'impose donc plus. Au-dessus de 700m il pourra encore être appliqué dans les prochains jours au stade sensible.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A.PITHIoud

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes
Directeur-gérant: L.BOUYX

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P.LATARD

757